



Public Health
Agency of Canada

Agence de la santé
publique du Canada

CANVAX

Canada

Le 29 Novembre 2021

COURT WEBINAIRE DE L'ASPC : Mise à jour des recommandations du CCNI – Doses supplémentaires de vaccins contre la COVID-19 pour les personnes immunodéprimées

PROTÉGER LES CANADIENS ET LES
AIDER À AMÉLIORER LEUR SANTÉ



Objectifs

- Identifier les personnes pour lesquelles le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) recommande l'administration d'une dose supplémentaire
- Discuter avec les clients immunodéprimés du besoin et de l'effet potentiel d'une dose supplémentaire sur leur niveau de protection



Documentation de référence

Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) : Déclarations et publications

▼ COVID-19

Déclarations actuelles sur les vaccins

- 19 novembre 2021 : [Recommandation sur l'utilisation du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech \(10 mcg\) chez les enfant âgés de 5 à 11 ans \(PDF\)](#)
 - [Résumé de la déclaration du CCNI du 19 novembre 2021 \(PDF\)](#)
- 29 octobre 2021 : [Orientations provisoires du CCNI sur la dose de rappel d'un vaccin contre la COVID-19 au Canada](#)
 - [Résumé de la déclaration d'orientations provisoires du CCNI du 29 octobre 2021](#)
- 22 octobre 2021 : [Recommandations sur l'utilisation du vaccin contre la COVID-19](#)
 - [Résumé de la mise à jour de la déclaration sur les vaccins du CCNI du 22 octobre 2021](#)
 - [Tableau des mises à jour](#)
- 28 septembre 2021 : [Réponse rapide du CCNI : Dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 chez les résidents en établissements de soins de longue durée et les aînés vivant dans d'autres milieux de vie collectifs](#)
 - [Résumé de la réponse rapide du CCNI du 28 septembre 2021](#)
- ★ 10 septembre 2021 : [Réponse rapide du CCNI : Dose supplémentaire de vaccin contre la COVID-19 chez les sujets immunodéprimés après une série primaire d'une ou deux doses](#)
 - [Résumé de la réponse rapide du CCNI du 10 septembre 2021](#)

Les éléments probants, la justification et les informations plus détaillées sur lesquels reposent les recommandations traitées lors de ce webinaire se trouvent dans les [déclarations rapides du CCNI](#) publiées le **10 septembre 2021**.

Le CCNI a formulé des recommandations concernant l'administration de doses supplémentaires de vaccins contre la COVID-19

Les personnes qui présentent une **immunodépression modérée à sévère** devraient recevoir une dose supplémentaire d'un vaccin à ARNm à la suite d'une série primaire



Apprenez-en davantage sur les recommandations du CCNI concernant les doses de rappel pour d'autres populations, dans le webinaire : Orientations provisoires du CCNI sur la dose de rappel d'un vaccin contre la COVID-19 au Canada

Il existe une différence entre une dose supplémentaire et une dose de rappel.

Une **dose supplémentaire** est administrée à la suite d'une série primaire complète d'une ou deux doses pour améliorer l'immunité des personnes dont la réponse immunitaire aux doses précédentes est réduite.

Une **dose de rappel** est une dose qui suit la série primaire et qui est administrée en raison du déclin de l'immunité.

Qui est considéré comme étant modérément ou gravement immunodéprimé ?

Les personnes qui souffrent de certains problèmes de santé ou qui reçoivent des traitements comme par exemple:

- Traitement actif contre des **tumeurs malignes solides** ou **hématologiques**
- **Greffe d'organe plein** avec **traitement immunosuppresseur**
- Traitement par **récepteurs d'antigènes chimériques (CAR-T)** ou **greffe de cellules souches hématopoïétiques**
 - dans les deux ans suivant la greffe ou le traitement immunosuppresseur

(suite à la diapositive suivante)

Qui est considéré comme étant modérément ou gravement immunodéprimé ?

- **Immunodéficience modérée à sévère** (p. ex. syndrome de DiGeorge ou syndrome de Wiskott-Aldrich)
- **Infection au VIH non traitée de stade 3 ou avancée** et personnes atteintes du syndrome d'immunodéficience acquise (**SIDA**)
- **Traitement actif par l'une des catégories suivantes de traitement immunosuppresseur:**
 - Thérapies anti-cellules B (anticorps monoclonaux ciblant CD19, CD20 et CD22)
 - Corticostéroïdes systémiques à fortes doses
 - Agents alcoylants
 - Antimétabolites
 - Inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale (TNF) et autres agents biologiques significativement immunosuppresseurs

Ce webinaire et les scénarios suivants reflètent les recommandations du CCNI concernant les personnes immunodéprimées qui étaient valides en date du 29 novembre 2021.

L'admissibilité à une dose supplémentaire est établie par les administrations provinciales et territoriales.

- La définition des personnes qui sont admissibles au sein des différents territoires peut différer des recommandations formulées par le CCNI.



Pour les scénarios sur la mise en application des recommandations du CCNI sur les doses de rappel, voir le webinaire: Orientations provisoires du CCNI sur la dose de rappel d'un vaccin contre la COVID-19 au Canada

Scénario 1

- Avery a 32 ans; iel a bénéficié d'une greffe rénale il y a six ans
 - iel est par ailleurs en bonne santé.
- Iel suit un traitement immunosuppresseur.
- Une dose supplémentaire est-elle recommandée dans son cas?



Scénario 1: Réponse



- Une dose supplémentaire de vaccin contre la COVID-19 est recommandée parce qu'il a reçu une **greffe d'organe plein** et reçoit un **traitement immunosuppresseur**.
- Vous pouvez également informer Avery que :
 - Une dose supplémentaire pourrait contribuer à améliorer sa réponse immunitaire
 - Même après la dose supplémentaire, iel pourrait avoir **moins de protection qu'une personne qui n'est pas immunodéprimée** ayant reçu une série complète du vaccin
 - Iel devrait continuer à faire preuve de prudence et à inciter son entourage à se faire vacciner

Scénario 2



- André a 42 ans; et vit avec le VIH.
- Il est actuellement sous traitement antirétroviral, présente une charge virale non détectable et une numération de T-CD4 normale.
- Une dose supplémentaire est-elle recommandée dans son cas?

Scénario 2: Réponse



- Nous pouvons informer André que nous nous attendons à ce que, pour le moment, il soit toujours bien protégé par la série primaire de vaccins COVID-19:
 - Il n'en est pas à un stade de VIH avancé et non traité
 - Sa charge virale est non détectable et il a une numération des lymphocytes T-CD4 normale.Il n'est pas donc pas considéré comme modérément ou gravement immunodéprimé.
- Actuellement, une dose supplémentaire (sur la base de l'immunodépression) n'est recommandée que pour les personnes atteintes du **VIH à un stade avancé non traité** ou celles atteintes du **sida**.

Scénario 3

- Marie a 62 ans; elle souffre d'un diabète de type 2, d'hypertension artérielle et de signes précoces de démence.
- Elle semble « attraper » tous les microbes qui passent, et des médecins lui ont déjà dit qu'elle semblait avoir un système immunitaire un peu faible.
- Marie vit avec son fils mais, en raison de la détérioration de ses fonctions cognitives, elle déménagera dans un établissement de soins de longue durée dans l'année à venir.
- Une dose supplémentaire est-elle recommandée dans son cas?




Scénario 3: Réponse



- Marie n'est pas considérée comme étant modérément ou gravement immunodéprimée.
 - Bien que Marie souffre de problèmes de santé sous-jacents, elle n'a pas de problème médical et ne reçoit pas de traitement qui sont associés à une immunodépression modérée à sévère.
- Vous pouvez discuter avec Marie et ses soignants que:
 - une dose supplémentaire n'est pas recommandée pour le moment, car elle devrait encore être bien protégée par la série de vaccins primaires COVID-19
 - Une dose de **rappel** sera recommandée lorsqu'elle déménagera dans un établissement de soins de longue durée.

Remarque : Les recommandations de doses de **rappel** varient en fonction des critères d'éligibilité en vigueur dans votre juridiction.

Abonnez-vous aux publications du CCNI et aux mises à jour du Guide canadien d'immunisation



Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) : Déclarations et publications

Déclarations et publications | À propos de nous | Réunions
Plan de travail | Méthode et processus | Liens connexes

Le CCNI formule des recommandations pour l'utilisation des vaccins déjà homologués ou nouveaux au Canada et destinés aux humains, y compris l'identification de groupes à risque de contracter de la vaccination. Les synthèses de connaissances, les analyses et les recommandations du CCNI au Canada sont tous publiés dans les synthèses de la littérature, les déclarations et les mises à jour.

Les nouvelles déclarations sont celles qui ont été publiées au cours des cinq dernières années. Les déclarations précédentes sont celles qui ont été publiées il y a plus de cinq ans et qui ont été archivées.

Des déclarations et des mises à jour supplémentaires sont aussi publiées dans le [guide canadien d'immunisation](#). Les mises à jour par courriel sont disponibles à travers notre liste de diffusion.

Abonnez-vous | Guide canadien d'immunisation

Abonnez-vous

Pour obtenir de l'information sur les mises à jour du Guide canadien d'immunisation et des nouvelles recommandations, déclarations supplémentaires et synthèses de la littérature du Comité consultatif national d'immunisation (CCNI), inscrivez votre adresse courriel ci-dessous et cliquez sur le bouton d'abonnement.

* Votre adresse courriel (obligatoire)

* Mise(s) à jour préférée(s) (obligatoire)

- Guide canadien d'immunisation
- CCNI Recommandations, déclarations supplémentaires et mises à jour

* Veuillez indiquer la catégorie décrivant le mieux votre titre professionnel et/ou votre expérience professionnelle (obligatoire)

- Médecin (généraliste)
- Médecin (spécialiste)
- Infirmier ou infirmière
- Infirmier praticien ou infirmière praticienne / Catégorie supérieure
- Pharmacien
- Chercheur de laboratoire / Technicien de laboratoire
- Autre

Si une autre catégorie, veuillez préciser :

<https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni.html>

Trousse à outils pour les fournisseurs de soins de santé de l'ASPC



Contenu de la trousse

- **À propos de la COVID-19** : Renseignements généraux, notamment sur les symptômes et les mesures de prévention, et recommandations à l'intention des professionnels de la santé, des soins sécuritaires selon la culture et des déclarations de la part de l'administrateur en chef de la santé publique du Canada
- **Aperçu des vaccins** : Les vaccins contre la COVID-19 au Canada, comment se faire vacciner, couverture vaccinale à l'échelle nationale, expéditions et livraisons, comment les vaccins sont développés, ainsi que l'information à l'intention des Autochtones
- **Vaccins autorisés** : Renseignements sur les vaccins contre la COVID-19 qui sont autorisés par Santé Canada
- **Guide à l'intention des fournisseurs de soins de santé** : Guide pour la gestion des séances de vaccination contre la COVID-19 et l'administration des vaccins contre la COVID-19, recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation, orientation sur l'anaphylaxie, composantes des vaccins et atténuation de la douleur
- **Confiance dans les vaccins** : Renseignements et formation sur la confiance dans les vaccins, ainsi que des réponses aux questions courantes
- **Sécurité des vaccins** : Aperçu de la sécurité des vaccins, de la surveillance et de l'établissement de rapports, renseignements sur les effets secondaires possibles et effets secondaires signalés au Canada
- **Ressources supplémentaires** : Ressources des provinces, des territoires et des intervenants, communications et outils numériques, contenu et ressources pour les plateformes des médias sociaux
- **Conditions d'utilisation** : Renseignements sur l'utilisation du mot symbole « Canada » et des ressources de la trousse à outils


<https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/2019-novel-coronavirus-infection/health-professionals/covid-19-healthcare-professionals-vaccine-toolkit.pdf>

Pour d'autres webinaires de l'ASPC sur la COVID-19, visitez les sites :



COVID-19 pour les professionnels de la santé : Formation

<https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/formation.html>



National Collaborating Centre
for Infectious Diseases
Centre de collaboration nationale
des maladies infectieuses

Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses

<https://ccnmi.ca/les-webinaires-de-lagence-de-la-sante-publique-du-canada-sur-les-vaccins-contre-la-covid-19/>



Centre canadien de ressources et d'échange de données probantes sur la vaccination (CANVax) <https://www.canvax.ca/fr/serie-de-webinaires-du-canvax>

Voici quelques-uns des sujets traités :

- Fondements sur les vaccins contre la COVID-19
- Allergies et seringues à faible volume mort
- Réactions tardives au site d'injection
- Autres recommandations du CCNI sur l'utilisation des vaccins contre la COVID-19